

ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

# 团 体 标 准

T/SAAV XXXXX—2024

## 羌山云朵鸡

Qiangshan Cloud Chicken

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

四川省畜牧兽医学会 发布

## 目录

|                    |   |
|--------------------|---|
| 前 言 .....          | 3 |
| 1 范围 .....         | 4 |
| 2 规范性引用文件 .....    | 4 |
| 3 品种原产地和特性 .....   | 4 |
| 4 外貌特征 .....       | 4 |
| 5 体重和体尺 .....      | 4 |
| 6 繁殖性能 .....       | 5 |
| 7 肉用性能 .....       | 6 |
| 8 测定方法 .....       | 6 |
| 附录 A 羌山云朵鸡图片 ..... | 7 |

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由阿坝州农业科学院提出。

本文件由四川省畜牧兽医学会归口。

本文件起草单位：阿坝州农业科学院、汶川县科学技术和农业畜牧

本文件主要起草人：张燕、吴锦波、杨小林、李星亮、李荣宏、余春林、阳武、邱莫寒、牟桑、冉强、王德贵、蒙欣等。

# 羌山云朵鸡

## 1 范围

本标准规定了羌山云朵鸡的品种原产地和特性、外貌特征、体重和体尺、繁殖性能、肉用性能和测定方法。本标准适用于羌山云朵鸡品种。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

NY/T 823—2004 家禽生产性能名词术语和度量统计方法。

## 3 品种原产地和特性

羌山云朵鸡原产地和中心产区为四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县的 9 个乡镇，茂县南新镇、凤仪镇、沟口镇和理县桃坪镇、薛城镇也有零星分布。羌山云朵鸡羽色与大熊猫毛色相似，黑白分明，故被当地老百姓称为“熊猫鸡”。属蛋肉兼用型地方品种；具有耐粗饲、杂食性强、抗逆性尤其是高原低氧适应性强、肉质风味良好等特征。

## 4 外貌特征

羌山云朵鸡单冠直立，冠、肉髯、耳叶呈红色；耳部羽毛呈灰白色；皮肤白色，胫呈黑色或青灰色。公鸡头部高昂，体躯粗壮，体长、胸深，胸部发达，背稍窄，胫高而略粗；颈羽、鞍羽为白色或黑色镶白边，主翼羽、覆主翼羽和尾羽多为黑色并有亮绿色金属光泽。母鸡头颈美观、冠小红润，颈羽为黑羽镶白边，向后延伸至背部变为黑羽。雏鸡绒毛以全黑色为主，部分眼周、颈部和腹部绒毛呈白色，喙、胫为青色。成年羌山云朵鸡图参见附录 A。

## 5 体重和体尺

300 日龄体重和体尺见表 1。

表 1 300 日龄体重和体尺

| 项 目    | 公鸡          | 母鸡          |
|--------|-------------|-------------|
| 体重/g   | 2486~2736   | 1757~2071   |
| 体斜长/cm | 17.56~24.06 | 16.24~18.42 |
| 胸宽/cm  | 5.48~6.26   | 5.08~5.76   |
| 龙骨长/cm | 12.65~14.33 | 10.25~12.35 |
| 髌骨宽/cm | 6.4~8.2     | 6.1~7.6     |
| 胫长/cm  | 10.47~11.45 | 7.76~8.42   |
| 胫围/cm  | 4.69~5.21   | 3.85~4.29   |

## 6 繁殖性能

繁殖性能见表 2。

表 2 繁殖性能

| 项 目           | 范 围       |
|---------------|-----------|
| 开产日龄/d        | 140~145   |
| 72 周龄饲养日产蛋数/个 | 90~130    |
| 72 周龄平均蛋重/g   | 37~41     |
| 蛋壳颜色          | 褐色        |
| 蛋形指数          | 1.25~1.37 |
| 受精率/%         | 83 ~ 88   |
| 受精蛋孵化率/%      | 83 ~ 86   |

## 7 肉用性能

13 周龄肉用性能见表 3。

表 3 13 周龄肉用性能

| 项 目         | 公 鸡           | 母 鸡           |
|-------------|---------------|---------------|
| 体重/g        | 560~660       | 520~620       |
| 屠 体 率 / %   | 89~92         | 87~90         |
| 半 净 膛 率 / % | 80~86         | 76~83         |
| 全 净 膛 率 / % | 69~73         | 67~75         |
| 腿 肌 率 / %   | 25~28         | 20~24         |
| 胸 肌 率 / %   | 16~19         | 15~18         |
| 饲 料 转 化 比   | 3.81:1~4.14:1 | 3.93:1~4.23:1 |

## 8 测定方法

外貌特征的描述采用目测。体重和体尺、繁殖性能和肉用性能的测定按照 NY/T 823—2004 规定执行。

## 附录 A 羌山云朵鸡图片

(资料性附录)

A.1 成年羌山云朵鸡个体公鸡见图 A.1。



图 A.1 成年羌山云朵鸡(个体公鸡)图

A.2 成年羌山云朵鸡个体母鸡见图 A.2。



图 A.2 成年羌山云朵鸡(个体母鸡)图

A.3 成年羌山云朵鸡群体公鸡见图 A.3。



图 A.3 成年羌山云朵鸡(群体公鸡)图

A.4 成年羌山云朵鸡群体母鸡见图 A.4。



图 A.4 成年羌山云朵鸡(群体母鸡)

A.5 成年羌山云朵鸡雏鸡群体见图 A.5。



图 A.5 成年羌山云朵鸡(公母混合群体)图

图 A.5 成年羌山云朵鸡(公母混合群体)图