ICS 65.020.20
CCS B 25

团　　体　　标　　准

T/SAAV 14—2026

饲用苎麻生产技术规程

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

四川省畜牧兽医学会　　发 布

目　　次

前言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 品种选择 1
5 种植条件 1
6 育苗 1
7 土地整理 1
8 移栽 2
9 栽培技术 2
10 田间管理 2
11 刈割 2
12 青贮 3
13 利用 3

前　言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由四川省畜牧兽医学会提出并归口。

本文件起草单位：达州市农业科学研究院、四川省畜牧科学研究院、重庆市渝东南农业科学院、巴中市农林科学研究院、宜宾市农业科学院。

本文件主要起草人：甘伟，张中华，崔忠刚，任小春，余行，马彬荣，李涛，邝良德，江晓波，杨小丽，任小松，吴鹏，吕发生，李丛艳，黄涛，李钰莹，李赟，易治鑫，吴长凤，周力，雷岷，郭志强。

本文件为首次发布。

饲用苎麻生产技术规程

1 范围

本文件规定了饲用苎麻生产的术语和定义、品种选择、种植条件、育苗、土地整理、移栽、栽培技术、田间管理、刈割、青贮、饲喂。

本文件适用于饲用苎麻生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。其中，注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4456　包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 8946　塑料编织袋通用技术要求

GB/T 23181　微生物饲料添加剂通用要求

GB/T 40935　青贮牧草膜

NY/T 2042　苎麻主要病虫害防治技术规范

NY/T 4470　全株玉米青贮质量分级

DB51/T 426　苎麻生产技术规程

3 术语和定义

3.1

饲用苎麻

以收获青绿茎叶营养体用于饲喂畜禽为主要生产目的一类苎麻品种。

4 品种选择

应通过国家或省级非主要农作物品种审定、登记或认定。

5 种植条件

海拔高度不超过1100 m，年均气温15 ℃，年积温在5200 ℃～5800 ℃，无霜期300 d以上，年降水量1000 mm以上，年均日照1000 h以上。

6 育苗

参照DB51/T 426执行。

7 土地整理

深翻土20 cm，参照DB51/T 426施足底肥。

8 移栽

4月下旬～6月下旬、9月下旬～10月中旬，苗高15 cm且有7片叶以上。

9 栽培技术

9.1 净作

每窝1苗～2苗。

9.1.1 平坝种植方式

等行距：行距60 cm，窝距40 cm。
宽窄行：宽行80 cm，窄行30 cm，窝距40 cm。

9.1.2 坡地种植方式

等行距：行距50 cm，窝距40 cm。
宽窄行：宽行70 cm，窄行30 cm，窝距40 cm。

9.2 套轮作

饲用苎麻：宽行120 cm，窄行40 cm，窝距40 cm。
玉米：3月中下旬在饲用苎麻宽行播种玉米2行，饲用苎麻与玉米间距30 cm，玉米行距60 cm，窝距40 cm，每窝1苗～2苗。
黑麦草：9月下旬～10月上旬，在饲用苎麻行间条播黑麦草；宽行条播2行，饲用苎麻与黑麦草间距30 cm，黑麦草播幅60 cm，条播行距15 cm；窄行条播1行，饲用苎麻与黑麦草间距20 cm。

10 田间管理

10.1 中耕除草

新栽苗至首次刈割，除草2次～3次，后续视田间杂草情况而定。中耕深度10 cm，行间宜深，蔸边宜浅。

10.2 追肥

苗移栽15 d～20 d后施尿素（N≥46%）1.5 kg～2 kg/亩。每年第一次收获前施尿素4 kg～6 kg/亩；每次收获后施尿素7 kg～10 kg/亩。

10.3 冬季管理

12月中旬～1月上旬。施腐熟有机肥2000 kg/亩，或腐熟有机肥200 kg/亩+45%复合肥（N：P：K=15%:15%:15%）25 kg/亩。腐熟有机肥或秸秆覆盖麻蔸使龙头根、边蔸不露出地面。

10.4 病虫害防治

参照NY/T 2042执行。

11 刈割

株高80 cm～120 cm收获，留茬高度不超过5 cm。

12 青贮

12.1 原料收割

选取无污染、无霉变、无杂物的原料，切碎至2 cm～3 cm。

12.2 水分调制

将原料含水量晾晒至65%～75%。

12.3 青贮方式

12.3.1 单一青贮

需添加青贮发酵剂，添加量应为说明书推荐最低用量的10倍～15倍，添加剂应符合GB/T 23181规定。

12.3.2 混合青贮

饲用苎麻与全株玉米（或玉米、高粱等秸秆）按不高于1:1比例（鲜重比）搅拌混合均匀后青贮。

12.4 裹包青贮

利用打捆机、包膜机进行裹包青贮，贮存期小于3个月的包膜不低于3层，贮存期大于3个月的包膜应不低于6层。包膜品质应符合GB/T 40935的规定。

12.5 方装青贮

利用方装机进行装袋，内袋为聚乙烯薄膜，厚度0.12 mm以上，应符合GB/T 4456的规定。外袋为单层聚丙烯或聚乙烯塑料编织袋，应符合GB/T 8946的规定。

12.6 贮存管理

场地应平坦干燥、通风，有遮棚，防止阳光直射、雨淋。防鼠、防鸟。

12.7 感官要求

参照NY/T 4470执行。

13 利用

13.1 鲜饲

株高80 cm～120 cm刈割，饲喂牛羊切短至3 cm、兔禽猪切短至1 cm。

13.2 青贮饲喂

可饲喂牛羊猪兔禽。青贮45 d后即可饲喂，当日打开须当日饲喂完。