ICS 65.020.30
CCS B 43

团　　体　　标　　准

T/SAAV 4—2026

山地梅花鸡

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

四川省畜牧兽医学会　　发布

目　　次

前言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 外貌特征 1
5 300 日龄成年体重体尺 2
6 生产性能 2
7 肌肉品质 3
8 繁殖性能与蛋品质 4
9 测定方法 5
附录 A（资料性） 山地梅花鸡体型外貌特征图 6

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由四川省畜牧兽医学会提出并归口。

本文件起草单位：四川农业大学、巴中市农林科学研究院、四川省畜牧科学研究院、通江县畜牧站、巴中市农业农村局、四川省畜牧总站、通江放养森林农业科技有限公司、通江县动物疫病预防控制中心、巴中龙溪生态农业有限公司、通江县杨柏镇新桥河村股份经济合作联合社、通江县杨柏镇太平场村股份经济合作联合社。

本文件主要起草人：赵小玲、易治鑫、舒刚、李林祥、杨朝武、王英杰、吴柳亭、王万霞、徐军、叶林、陈玉慧、欧钟明、吴长凤、江淮、李柯锐、李倩、张守成、陈栋、闵星星、谭玉祥、余洲、李洪熙、王元斌、冯丽、苟斌才、赵怀舜。

本文件为首次发布。

山地梅花鸡

1 范围

本文件规定了山地梅花鸡的遗传资源外貌特征、300 日龄成年体尺体重、生产性能、肌肉品质、繁殖性能和蛋品质等特征特性。

本文件适用于保种、繁育群体的山地梅花鸡品种的鉴别和标准化生产指导。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5009.3　食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.4　食品安全国家标准 食品中灰分的测定

GB 5009.5　食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

GB 5009.6　食品安全国家标准 食品中脂肪的测定

GB/T 47210　家禽生产性能术语

NY/T 823　家禽生产性能名词术语与度量统计方法

NY/T 2793　肉的食用品质客观评价方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

山地梅花鸡

山地梅花鸡，又名“菜花鸡”“竹斑鸡”，属中等体型的肉蛋兼用地方品种，抗逆性强、耐粗饲、适应性广。原产于四川省巴中市通江县，全县域分布，中心产区在通江县铁佛、松溪、诺水河、广纳、瓦室等 13 个乡镇，平昌县、巴州区等亦有分布。

4 外貌特征

山地梅花鸡头颈挺立、背平直，体躯呈船形。喙基部微黑，尖端呈米黄色。鸡冠为单冠，直立、呈红色，部分公鸡个体冠末端底部左右两侧有一突出的柱状“冠指”。耳叶红色和红白色。肉髯红色，虹彩呈棕黄色。胫细长，白色为主，公鸡胫部外侧具有特殊的纵向深红色“血线”特征。皮肤呈白色。成年鸡全身羽毛呈金黄色或银白色，公鸡梳羽、鞍羽、蓑羽、翼羽为黑褐色斑点羽，主翼羽、副主翼羽、镰羽为黑褐色横斑羽，横斑羽层层覆盖，羽枝末端的斑点似雪地点点梅花。母鸡颈羽、背羽、尾羽、翼羽为铅笔纹羽，羽毛层层覆盖，羽枝末端呈月牙状图案，似雪地簇簇梅花。雏鸡羽色有纯黄白色、灰黑色、红棕色。雏鸡、公鸡和母鸡外貌参见附录 A。

5 300 日龄成年体重体尺

成年山地梅花鸡（300 日龄）公、母鸡体重及体尺见表 1。

表 1 成年山地梅花鸡体重体尺

指标	公鸡	母鸡
体重/g	2500~3400	2200~2700
体斜长/cm	24~28	21~23
龙骨长/cm	14~16	11~14
背宽/cm	8~9	7~8
胫长/cm	11~13	10~11
胫围/cm	5~6	4~5
胸围/cm	30~40	30~40
胸宽/cm	9~10	6~7
胸深/cm	11~13	10~11

6 生产性能

6.1 生长性能

山地梅花鸡生长发育性能见表 2。

表 2 山地梅花鸡生长发育性能

周龄	体重/g		周龄	体重/g	
	公鸡	母鸡		公鸡	母鸡
0	30~40	30~40	8	710~930	600~800
1	60~80	50~80	9	880~1100	760~930
2	110~150	110~150	10	1060~1280	900~1080
3	170~240	170~230	12	1260~1600	1130~1310
4	280~370	260~320	14	1840~2170	1300~1730
5	370~470	330~440	16	1950~2200	1380~1740
6	470~630	470~600	18	2080~2400	1570~1800
7	530~700	500~630			

6.2 180 日龄屠宰性能

山地梅花鸡 180 日龄（上市）的屠宰性能见表 3。

表 3 山地梅花鸡 180 日龄屠宰性能

指标	公鸡	母鸡
活体重/g	2050~2700	1640~1990
屠体重/g	1900~2310	1440~1730
半净膛重/g	1700.0~2090.0	1270.0~1530.0
全净膛重/g	1480.0~1870.0	1130.0~1400.0
胸肌重/g	230.0~300.0	170.0~210.0
腿肌重/g	320.0~460.0	250.0~290.0
腹脂重/g	20.0~26.0	53.0~67.0

7 肌肉品质

7.1 180 日龄肌肉理化性质

山地梅花鸡 180 日龄（上市）的肌肉理化性质见表 4。

表 4 山地梅花鸡 180 日龄肌肉理化性质

指 标	胸肌		腿肌		检测方法
	公鸡	母鸡	公鸡	母鸡	
亮度/L^*	47.5~56.5	44.0~53.2	35.0~42.7	37.1~44.3	NY/T 2793
红度/a^*	23.3~29.0	21.1~27.5	13.9~17.0	15.5~19.9	NY/T 2793
黄度/b^*	11.6~14.7	13.3~17.5	8.8~11.1	10.2~13.5	NY/T 2793
pH_{45min}	5.9~6.3	6.0~6.5	6.0~6.3	6.1~6.6	NY/T 2793
pH_{24h}	5.8~6.0	5.9~6.0	5.9~6.1	6.0~6.2	NY/T 2793
剪切力/N	28.0~36.0	31.0~39.0	31.0~38.0	31.0~42.0	NY/T 2793
滴水损失/%	1.8~2.4	1.9~2.5	1.7~2.5	1.8~2.4	NY/T 2793

7.2 180 日龄肌肉常规化学成分

山地梅花鸡 180 日龄（上市）的肌肉理化性质见表 5。

表 5 山地梅花鸡 180 日龄肌肉常规化学成分含量

指标	胸肌		腿肌		检测方法
	公鸡	母鸡	公鸡	母鸡	
粗脂肪/%	1.4~1.5	1.20~1.4	1.9~2.4	1.9~2.3	GB 5009.6
粗蛋白/%	23.0~24.0	23.0~24.0	22.0~25.0	23.0~24.0	GB 5009.5
水分/%	72.0~76.0	70.0~72.0	71.0~75.0	66.0~76.0	GB 5009.3
干物质/%	23.0~24.0	28.0~30.0	25.0~29.0	24.0~34.0	/
灰分/%	1.1~1.2	1.1~1.3	1.0~1.2	0.9~1.1	GB 5009.4

8 繁殖性能与蛋品质

8.1 繁殖性能

山地梅花鸡在笼养条件下的繁殖性能见表 6。

表 6 山地梅花鸡繁殖性能

项目	数值
达 5%产蛋率/周龄	21~24
开产体重/g	1600~1700
开产蛋重/g	37~40
43 周龄入舍鸡产蛋数/枚	50~70
高峰期产蛋率/%	70~72
66 周龄入舍鸡产蛋数/枚	110~130
蛋壳颜色	粉色、白色、褐色
受精率/%	90~95
受精蛋孵化率/%	84~88
就巢性	有

8.2 300 日龄蛋品质

300 日龄山地梅花鸡的蛋品质见表 7。

表 7 300 日龄山地梅花鸡蛋品质

项目	数值
蛋重/g	49.0~59.0
蛋壳重/g	5.0~6.0
蛋形指数	1.3~1.4
蛋黄重/g	16.0~17.0
蛋黄颜色	9.0~9.5

9 测定方法

山地梅花鸡成年体重和体尺、屠宰性能和繁殖性能按照 GB/T 47210、NY/T 823 相关规定进行测定。

附录 A
（资料性）
山地梅花鸡体型外貌特征图



图 A.1.1 山地梅花鸡雏鸡



图 A.2.1 山地梅花鸡公鸡（银色）



图 A.2.2 山地梅花鸡母鸡（银色）



图 A.3.1 山地梅花鸡公鸡（金色）



图 A.3.2 山地梅花鸡母鸡（金色）



图 A.4 山地梅花鸡群体