ICS 65.020.30
CCS B 43

团　　体　　标　　准

T/SAAV 5—2026

优质土鸡标准化养殖技术规程

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

四川省畜牧兽医学会　　发 布

目　　次

前言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 场址选择与鸡舍建设 1
5 品种选择和雏鸡来源 2
6 饲养管理 2
7 疫病防控 6
8 无害化处理 6
9 出栏与运输 6
10 档案记录 7
附录 A（资料性） 免疫程序 8

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由四川省畜牧兽医学会提出并归口。

本文件起草单位：四川省畜牧科学研究院、四川农业大学、四川大学、西南科技大学、四川省动物疫病预防控制中心、成都市动物疫病预防控制中心、四川大恒家禽育种有限公司、四川省畜牧总站、广元市农业科学研究院、成都市畜禽资源中心、宜宾市农业科学院、剑阁县畜禽产业发展事务中心、阿坝州农业科学研究院、乐山市农业科学研究院、四川牧舟科技有限公司、简阳市家禽行业协会、古蔺县农业技术推广服务中心、宜宾市畜牧产业发展中心、巴中市农林科学研究院、达州市农业科学研究院、绵阳市农业科学研究院、四川蜀道源农业科技有限公司、广元古柏道农业开发有限公司、乡城县畜牧站。

本文件主要起草人：杨朝武、杨礼、宋小燕、余春林、刘益平、邱莫寒、尹华东、张增荣、张剑南、刘静波、陈弟诗、周潇潇、彭涵、胡陈明、王恒、汪江先、张国伟、李雯、熊霞、王万霞、青易、周力、王刚、吴锦波、陈鲜鑫、樊华、李阜灿、陈平、代禄敏、雷超、吕红兴、夏波、李林祥、甘伟、王育伟、陈家磊、朱师良、万国东、刘瑜、谢英。

本文件为首次发布。

优质土鸡标准化养殖技术规程

1 范围

本文件规定了优质土鸡养殖的术语和定义、场址选择与鸡舍建设、品种选择、饲养管理、疫病防控、无害化处理、出栏与运输、档案记录等技术要求。

本文件适用于优质土鸡的标准化、规范化养殖。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 13078　饲料卫生标准

GB 18596　畜禽养殖业污染物排放标准

GB/T 25886　养鸡场带鸡消毒技术要求

NY/T 388　畜禽场环境质量标准

NY/T 471　绿色食品饲料和饲料添加剂使用准则

NY/T 472　绿色食品 兽药使用准则

NY/T 682　畜禽场场区设计技术规范

NY/T 1167　畜禽场环境质量及卫生控制规范

NY/T 3075　畜禽养殖场消毒技术

《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25 号）

3 术语和定义

3.1

优质土鸡

指原产于我国的地方鸡种或以地方鸡种为素材培育而成的新品种（配套系）。

3.2

放养

在具备天然或人工植被的场地中，如山地、林地、草场、果园等，鸡只在人工设定的围栏内自由活动、自主觅食，并辅以人工补充饲料的养殖方式。

4 场址选择与鸡舍建设

4.1 鸡场选址与布局

鸡场选址与布局应符合 NY/T 682 的要求，场区应划分生活管理区、生产区、无害化处理区，各区之间有隔离设施。生产区分设育雏舍、育肥舍或放养场（舍）等。场区净道与污道严格分离，不得交叉。场区环境质量应符合 NY/T 388 和 NY/T 1167 的规定。

4.2 鸡舍建设

4.2.1 育雏舍

采用密闭式鸡舍，具备良好的采光、保温、隔热、通风及防鼠功能。内墙表面、地面光滑平整，易清洗消毒。

4.2.2 育肥舍

根据养殖模式采用密闭式或半开放式鸡舍。舍内立体笼养宜采用密闭式鸡舍，舍内平养地面宜采用硬化处理后铺设垫料或网床，并设置栖架。

4.2.3 放养场

放养场可选择林地、果园、草场、山坡等，场内设置简易棚舍或移动式鸡舍，场区四周安装围栏，并配备饮水设施和补饲点。

5 品种选择和雏鸡来源

5.1 品种选择

选择抗病力强、适应性好、体型大小适中、肉质优良、市场认可的地方鸡种或配套系。

5.2 雏鸡来源

须来源于具有《种畜禽生产经营许可证》《动物防疫条件合格证》的种鸡场，符合本品种要求，经产地检疫合格并持有有效检疫合格证明。

6 饲养管理

6.1 饲养模式

采用育雏期（初生～5 周龄）和育肥期（6 周龄～上市）两阶段饲养。育雏期选用地面育雏、网上育雏或笼养育雏；育肥期选用舍内平养、舍内笼养或舍内平养+舍外放养结合的饲养模式。同一饲养批次应实行全进全出制，公母鸡分群饲养。

6.2 饲料和饮水

饲料卫生质量应符合 GB 13078 和 NY/T 471 的规定，严禁使用发霉、变质或被污染的饲料。饮水质量应符合 NY/T 388 的规定。

6.3 育雏期管理

6.3.1 育雏前准备

进雏前对鸡舍、用具进行全面清洗消毒，并提前预热。鸡舍、饲养设备的清洗和消毒按 GB/T 25886 和 NY/T 3075 的规定进行，鸡舍环境质量应符合 NY/T 388 的规定。

6.3.2 饮水和开食

雏鸡入舍后，先饮温水 2 h～3 h。首次饮水添加 3%～5%葡萄糖或电解多维。饮水器应每日清洗。饮水 2 h～3 h 后开食。1 周内使用开食盘，少喂勤添，每日饲喂 6 次～8 次；2 周后逐步过渡到料线或大料桶，逐步减少至每日饲喂 3 次～4 次。

6.3.3 营养需要与饲喂

根据所选品种的推荐营养需要量，提供相应营养水平的全价配合饲料。宜提供较高代谢能和粗蛋白水平的全价配合饲料，育雏期采用自由采食。

6.3.4 温度与湿度

育雏舍内空气的温度和相对湿度应符合表 1 的规定，以鸡群分布均匀、不扎堆为宜。

表 1 育雏期温度与湿度

日龄	温度 ℃	湿度 %
1~3	35~36	65~70
4~7	33~35	60~65
8~14	31~33	60~70
15~21	28~31	55~65
22~28	25~28	55~65
29~35	23~25	55~65

6.3.5 饲养密度

不同育雏模式的饲养密度应符合表 2 的规定。

表 2 育雏期饲养密度

周龄	地面育雏 只/m²	网上育雏 只/m²	笼养育雏 只/m²
0~1	25~35	30~35	40~50
2~3	15~20	20~25	30~40
4~5	10~15	15~20	25~30

6.3.6 光照

育雏期光照程序见表 3。舍内宜使用养殖专用光源，光源的安装布局应满足人员作业区和养殖活动区的照度要求，并确保光照均匀。

表 3 育雏期光照程序

日龄	光照时长 h	光照强度 lx	备注
1~3	24	20~30	

表 3 育雏期光照程序（续）

日龄	光照时长 h	光照强度 lx	备注
4~7	23	20~30	
8~35	22~12	10~20	光照时长每天减少 0.5 h，逐步过渡至 12 h 或自然光照。

6.3.7 通风

育雏期宜采用密闭式鸡舍，采用间歇最小通风量模式，舍内空气质量应符合 NY/T 388 的规定。

6.3.8 地面育雏管理

铺设 8 cm～10 cm 厚的干燥、清洁、无霉变垫料（稻壳、刨花、锯末等）。保持垫料干燥、松软，定时翻动，及时清理潮湿、结块垫料，补充清洁、干燥的垫料。每批鸡出栏后应彻底清除旧垫料，并对舍内进行全面消毒。

6.3.9 网上育雏管理

网床距地面 40 cm～60 cm，网孔直径 0.8 cm～1.5 cm。每日检查饮水器和料槽，保持清洁。每周全群观察一次，及时剔除弱雏。

6.3.10 笼养育雏管理

采用三层或四层育雏笼，配备自动饮水、喂料和清粪系统。笼底铺设塑料网垫。注意上下层温差不超过 2 ℃，下层笼位光照强度不低于 10 lx。每日检查水线、料线运行状态，每 3 d 清理粪盘或启动清粪带。

6.4 育肥期管理

6.4.1 营养需要与饲喂

育肥期应根据不同品种优质土鸡的推荐营养需要量提供全价饲料或自配料，宜适当降低蛋白质水平、维持或略提高能量水平。育肥期宜实行自由采食，每日早晚各加料一次，保持料槽中留有少量余料，以减少饲料浪费，如遇特殊情况，可适当限饲。舍外放养时可根据鸡只觅食草籽、昆虫等情况，适当下调补饲量。

6.4.2 饲养密度

6.4.2.1 育肥期采用舍内饲养或舍外放养相结合模式。舍内饲养分为舍内地面平养、网上平养或舍内笼养，舍内饲养密度见表 4。

表 4 育肥期舍内饲养密度

周龄	地面平养 只/m²	网上平养 只/m²	舍内笼养 只/m²
6~14	10~15	15~20	20~30

表 4 育肥期舍内饲养密度（续）

周龄	地面平养 只/m²	网上平养 只/m²	舍内笼养 只/m²
14～上市	8~10	10~12	20~25

6.4.2.2 舍外放养时坚持“宜稀不宜密”的原则。考虑土壤承载能力及生态平衡，不同放养场地养殖密度见表 5。

表 5 育肥期舍外放养饲养密度

植被类型	放养密度 只/亩	承载能力 只/亩/年
阔叶林	67	134
针叶林	30	60
山坡、灌木丛	40	80
果园	44	88
草地	25	50

6.4.3 光照

现代化环控鸡舍宜采用自动化光照控制系统，设定每日光照时长为 10 h～12 h，光照强度为 10 lx～20 lx；传统开放式鸡舍及放养条件下，采用自然光照与人工补光相结合的方式。

6.4.4 放养管理

6.4.4.1 放养设施

放养场依照地形设置围栏（高度≥1.5 m，网孔≤5 cm），遮阳遮雨棚面积不小于 0.1 m²/只。场内均匀设置饮水点和补饲点，每 50 只鸡配 1 个大号自动饮水器（≥15 L）。

6.4.4.2 放养日龄

放养不宜早于 5 周龄，放养前 3 d～5 d，宜在围栏内进行适应性饲养，逐步增加户外活动时间。转群放养宜选择晴好天气的上午进行，放养后前 3 d 应加强巡视，观察鸡群采食、饮水及归巢情况。气温低于 15 ℃季节，可适当推迟放养日龄。

6.4.4.3 放养训练

宜尽早训练鸡群，养成定时、定点投喂饲料的习惯。气温适宜时，选择晴朗天气，让鸡群到户外运动场活动，通过喂料、饮水和放牧等环节逐步建立条件反射，便于日常管理。

6.4.4.4 分区轮牧

实行分区轮流放养，林地、果园 3 亩～5 亩划为一个放养区，山坡、草地 5 亩～7 亩划为一个放养区，每个放养区用围墙、尼龙网或铁丝网等隔开，根据饲养数量及放养条件决定间歇养殖的时间，一般

两批鸡的放养间隔不少于 2 个月，期间应对放养区进行彻底清理、消毒、翻耕和植被恢复。寒冷地区冬季可适当延长休养期。

6.4.5 舍内平养管理

舍内地面应铺设垫料或采用网床。铺设垫料时，应保持垫料干燥，每批鸡出栏后彻底更换；采用网床时，应保持网面清洁、无破损。每日饲喂 2 次（早晚各 1 次），并保证充足饮水。

6.4.6 舍内笼养管理

应采用三层或四层层叠式笼具，配备自动饮水线、喂料线和清粪带。每只鸡的料位不应低于 5 cm，水位不应低于 2 cm。应保持舍内通风良好，上下层温差不应超过 2 ℃。每周清粪不宜少于 3 次。

6.5 动物福利和行为需求

应为鸡只提供干燥、清洁、舒适的休息环境（如设置栖架、沙浴池、铺设垫料等）。所有饲养和抓捕操作应避免对鸡只造成不必要的紧张、伤害和痛苦。

7 疫病防控

7.1 免疫接种

养殖场应根据本地疫病流行态势、本场病史、血清学抗体检测结果以及疫苗种类（如毒株匹配性）制定科学免疫程序，并严格按程序执行，免疫程序可参考附录 A。疫苗应来源正规，保存和使用符合规范。

7.2 兽药使用

兽药使用应符合 NY/T 472 的规定。不得使用违禁药物，严格执行休药期。

8 无害化处理

8.1 病死鸡处理

发现病鸡或死鸡时，应立即挑出，并按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》的规定进行无害化处理。严禁随意丢弃或出售。

8.2 养殖废弃物处理

鸡粪、垫料等废弃物应集中堆积发酵或采用其他无害化处理工艺，经处理符合 GB 18596 要求后方可还田利用。污水应经沉淀、厌氧发酵等处理达标后排放或循环利用。

9 出栏与运输

9.1 出栏

鸡只达到出栏体重和日龄后即可出栏。适宜上市日龄因品种而异：快速型 70 日龄左右，中速型 80 日龄～120 日龄，慢速型 120 日龄～180 日龄；具体时间可根据体重、饲料转化率和市场行情酌情调整。出栏前须经产地检疫，合格者开具《动物检疫合格证明》。装车运输前，须按规定停饲停水，一般停饲 8 h～12 h，停水 2 h～4 h。

9.2 运输

使用专用畜禽运输车辆，车厢应清洁、消毒、通风良好。运输过程中避免拥挤、高温、寒冷和剧烈颠簸，防止应激和损伤。

10 档案记录

应建立并保存完整的养殖档案，包括引种记录、饲料采购与使用记录、兽药采购与使用记录、免疫记录、消毒记录、病死鸡无害化处理记录、销售记录等。所有记录应真实、准确、完整，并保存 3 年以上。

附录 A
（资料性）
免疫程序

A.1 优质土鸡推荐免疫程序

优质土鸡推荐免疫程序见表A.1。

表 A.1 优质土鸡推荐免疫程序

日龄/d	疫苗名称	免疫方法
1	鸡马立克氏病活疫苗	颈部皮下注射
	新城疫+传染性支气管炎二联苗	滴眼或鼻
8	新城疫+传染性支气管炎二联苗	饮水
10	重组禽流感病毒（H5+H7）灭活苗	颈部皮下注射
14	鸡传染性法氏囊病疫苗	饮水
18	新城疫+传染性支气管炎二联苗	颈部皮下注射
21	禽流感病毒（H9）灭活苗	颈部皮下注射
25	重组禽流感病毒（H5+H7）灭活苗	颈部皮下注射
25	鸡痘冻干苗	翼膜刺种
55	新城疫+传染性支气管炎二联苗	滴眼或鼻
90	新城疫疫苗	饮水
120	新城疫疫苗	饮水