ICS 65.020.30
CCS B 43

团　　体　　标　　准

T/SAAV 6—2026

羌山云朵鸡

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

四川省畜牧兽医学会　　发布

目　　次

前言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 品种原产地和特性 1
4 外貌特征 1
5 体重和体尺 1
6 生长性能 2
7 屠宰性能 2
8 繁殖性能 3
9 蛋品质 3
10 测定方法 3
附录A（资料性） 羌山云朵鸡标准照 5

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由四川省畜牧兽医学会提出并归口。

本文件起草单位：阿坝州农业科学研究院、汶川县科学技术和农业畜牧局、四川省畜牧科学研究院。

本文件主要起草人：张燕、吴锦波、杨小林、李星亮、李荣宏、余春林、阳武、邱莫寒、牟桑、冉强、王德贵、蒙欣。

本文件为首次发布。

羌山云朵鸡

1 范围

本文件规定了羌山云朵鸡的原产地和品种特性、外貌特征、体重和体尺、生产性能、繁殖性能、肉用性能、蛋品质及测定方法。

本文件适用于羌山云朵鸡品种的鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 823—2020 家禽生产性能名词术语和度量计算方法

3 品种原产地和特性

羌山云朵鸡原产地和中心产区为四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县的9个乡镇：威州镇、绵虒镇、映秀镇、漩口镇、水磨镇、三江镇、耿达镇、卧龙镇、灞州镇；茂县南新镇、凤仪镇、沟口镇和理县桃坪镇、薛城镇也有零星分布。羌山云朵鸡羽色与大熊猫毛色相似，黑白分明，故被当地老百姓称为“熊猫鸡”。

羌山云朵鸡属蛋肉兼用型地方品种，具有耐粗饲、杂食性强、抗逆性尤其是高原低氧适应性强、肉质风味好等特征。

4 外貌特征

羌山云朵鸡单冠直立，冠、肉髯、耳叶呈红色；耳部羽毛呈灰白色；皮肤白色，胫呈黑色或青灰色。公鸡头部高昂，体躯粗壮，体长、胸深，胸部发达，背稍窄，胫高而略粗；颈羽、鞍羽为白色或黑色镶白边，主翼羽、覆主翼羽和尾羽多为黑色并有亮绿色金属光泽。母鸡头颈美观、冠小红润，颈羽为黑羽镶白边，向后延伸至背部变为黑羽。雏鸡绒毛以全黑色为主，部分眼周、颈部和腹部绒毛呈白色，喙、胫为青色。

成年羌山云朵鸡图参见附录A。

5 体重和体尺

43周龄体重和体尺见表1。

表1 43周龄体重和体尺

项目	公鸡	母鸡
体重/g	2611.00±125.21	1914.17±157.34
体斜长/cm	20.81±3.25	17.33±1.09
龙骨长/cm	13.49±0.84	11.30±1.05
胸深/cm	11.78±0.59	10.58±0.55
胸宽/cm	5.87±0.39	5.42±0.34

表1 43周龄体重和体尺（续）

项目	公鸡	母鸡
胫长/cm	10.96±0.49	8.09±0.33
胫围/cm	4.95±0.26	4.07±0.22

6 生长性能

0周龄～43周龄生长性能见表2。

表2 0周龄～43周龄生长性能

周龄/周	公鸡体重/g	母鸡体重/g
0	34.15±2.95	32.99±2.66
1	56.20±8.42	49.12±7.87
2	94.15±17.68	80.69±13.93
3	143.33±32.21	124.51±24.24
4	203.76±50.29	179.52±40.34
5	267.90±71.37	238.10±62.16
6	333.46±94.45	306.99±76.49
7	430.22±126.54	363.17±95.93
8	546.29±150.51	426.14±122.93
10	791.46±221.12	637.56±152.04
12	1125.73±276.73	880.52±188.69
14	1393.53±121.85	1075.47±120.81
18	1981.16±234.76	1398.56±238.51
22	2161.35±136.81	1582.79±184.77
29	2322.56±186.78	1730.86±198.12
43	2611.00±125.21	1914.17±157.34

7 屠宰性能

43 周龄屠宰性能见表3。

表3 43周龄屠宰性能

项目	公鸡	母鸡
宰前体重/g	2611.00±125.21	1914.17±157.34
屠宰率/%	87.91±1.41	90.34±1.69
半净膛率/%	81.45±4.95	78.61±6.57
全净膛率/%	69.94±4.85	64.52±6.56

表3 43周龄屠宰性能（续）

项目	公鸡	母鸡
胸肌率/%	13.44±2.04	14.86±2.30
腿肌率/%	26.22±1.91	19.60±2.15
腹脂率/%	1.87±0.12	2.80±0.16

8 繁殖性能

繁殖性能见表4。

表4 繁殖性能

项目	范围
开产日龄/d	140～145
开产体重/g	1450～1566
43周龄蛋重/g	48.59～55.55
66周龄入舍母鸡产蛋数/个	110～125
受精率/%	82.90～88.34
受精蛋孵化率/%	82.57～85.47
蛋壳色泽	褐色

9 蛋品质

43周龄蛋品质测定见表5。

表5 43周龄蛋品质测定

指标	测定数据
蛋重/g	52.07±3.48
蛋形指数	1.31±0.06
蛋壳厚度/mm	0.35±0.03
蛋壳强度/kg/cm²	4.73±0.24
哈氏单位	76.68±14.76
蛋壳色泽	褐色
蛋黄比率/%	32.20±1.10
蛋黄颜色/级	9.16±0.63

10 测定方法

外貌特征采用目测与标准图谱比对判定。

体重和体尺、繁殖性能和屠宰性能的测定按照NY/T 823—2020规定执行。

附录 A
（资料性）
羌山云朵鸡标准照

成年羌山云朵鸡公、母鸡照片见图A1、A2。



图A.1 成年羌山云朵鸡公鸡



图A.2 成年羌山云朵鸡母鸡